



و حرصا على سلامة الأرناب من هذا المرض يجب الوقاية الطبية إضافة إلى الوقاية الصحية باستعمال لقاح خاص ضد هذا الفيروس .
طريقة التحصين ضد مرض النزيف الدموي الفيروسي في شكله الجديد
أرناب اللحم : تحصين مرة واحدة في عمر 28 يوم وتذكير بعد 6 أسابيع في صورة ذبح الأرناب عمرها يفوق 70 يوم.

تجديد أمهات الأرناب

- تحصين مرة أولى في عمر 28 يوم
- تذكير التلقيح بعد 6 أسابيع من التحصين في المرة الأولى.
- تذكير التلقيح كل 6 أشهر.


مرض النزيف الدموي الفيروسي للأرناب في شكله الجديد

مرض وبائي يصيب الأرناب فقط

التلقيح الموجودة

يوجد في الوقت الحالي في بلادنا لقاح مرض النزيف الدموي الفيروسي للأرناب في شكله الجديد ويمكن اقتناؤه بالاتصال بالطبيب البيطري أو بالصيدلية واسمه (VARIANT FILAVAC VHD) مصنع من قبل مخبر فيلافي (FILAVIE)

تم أخيرا تسويق لقاح جديد في أوروبا تحصل على التأشيرة الصحية في أوروبا متكون من عطريتين (العطرة التقليدية و العطرة الجديدة) وقع تصنيعه من طرف مخبر فيلافي (FILAVIE) من المحتمل أن يقع توريده إلى تونس في المستقبل لتحصين الأرناب ضد مرض النزيف الدموي الفيروسي.




نزيف على مستوى الرئتين
(صورة د. خالد كبودي)



نزيف الأنف
(صورة د. خالد كبودي)



نزيف في القصبة
الهوائية
(صورة د. خالد كبودي)



نزيف داخل البطن
(صورة د. خالد كبودي)



التهاب الكبد
(صورة د. سفيان الصغير)

الوقاية من مرض النزيف الدموي الفيروسي

لا يوجد أي علاج لهذا المرض الفيروسي

لذا وجب الوقاية الصحية من هذا المرض لمنع دخول و تفشي الفيروس إلى المرنبية و ذلك باستعمال :

- ملابس و أحذية خاصة بالمرنبية.
- احترام الأماكن النظيفة.
- نظافة المرنبية و المعدات و العمال.
- مقاومة الحشرات و القوارض.
- منع دخول الحيوانات الأليفة داخل المرنبية أو بجانبها.
- اجتناب استعمال علف مأتاه منطقة يوجد بها الوباء.
- الحرص على اقتناء فحول ملقحة من مراكز الفحول المصادق عليها

أهمية المرض

مرض النزيف الدموي الفيروسي للأرانب هو مرض وبائي معدي يصيب الأرانب الأليفة و الأرانب البرية.

ظهور مرض النزيف الدموي الفيروسي يتسبب في نسبة نفوق كبيرة يمكن أن تتجاوز 90%. الفيروس الذي يتسبب في المرض من نوع كالسيفيروس الذي يمكن أن يصمد في المحيط الخارجي وخاصة إذا كان محمي بمواد عضوية يمكنه الصمود مدة ثلاثة أشهر عندما تكون الحرارة معتدلة كما يمكنه أن يبقى معدي عدة سنوات إثر التجميد، يعدّ هذا المرض في تونس من أهم الأمراض المعدية للأرانب.

في سنة 2010 ظهر هذا المرض في شكل جديد في فرنسا و وقع اكتشافه في بلادنا سنة 2015 وتسبب في خسائر هامة عند المريين و إفلاس البعض منهم.

أعراض المرض :

يصيب هذا المرض في شكله الجديد الخرائق تحت الأم أو بعد الفطم ابتداء من عمر 2 إلى 3 أسابيع في حين أن المرض المعتاد يصيب الأرانب التي يفوق عمرها 2 شهر.

تتسرب العدوى عبر الفم أو الجهاز التنفسي بالاتصال المباشر بين الحيوانات أو بالاتصال الغير مباشر بالماء و العلف أو معدات التربية أو ناقلات (حشرات أو ثدييات) ناقلة لفيروس النزيف الدموي.

يتسبب المرض في شكله الجديد في أعراض عند الخرائق تتمثل خاصة في :

- اليرقان (اصفرار الأغشية)
- نزيف في القصبة الهوائية
- فشل الكبد
- نفوق يمكن أن يبلغ نسبة 99%
- نزيف على مستوى الأنف في حالات نادرة
- تضخم الطحال
- احتقان الكلى و الغدة الصعترية
- إسهال مصفر